



Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Färdigspädd oral lösning 15 mg/mL (ex Dalacin)
 Alt. 2: Granulat till oral lösning 15 mg/mL, späds på vårdenhets (Dalacin, Sobelin Granulat licens, Clindamycin Pfizer licens)
 Alt. 3: Granulat till oral lösning 15 mg/mL, späds på vårdenhets (Clindamycin Palmitate Hydrochloride (Pediatric) licens)

För licensprodukterna uttrycks koncentrationen som 75 mg/5 mL (= 15 mg/mL).

Läkemedelsverket har gett särskilt tillstånd för receptförskrivning av licenspreparat klindamycin granulat till oral lösning när giltig generell licens finns, se Referenser.

OBS! Rutin för hantering av orala antibiotikapulver/granulat ska finnas för vårdenheten om alt. 2 används.

INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL LÖSN
15 mg/mL
 80 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Klindamycin 15 mg/mL 1 flaska	+	Sterilt Vatten 60 mL	=	ORAL LÖSN 15 mg/mL 80 mL
-------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------------------

Beredningsinstruktion:

För spädning av licensprodukt Clindamycin Palmitate Hydrochloride (Pediatric), se nästa sida (alt. 3).

Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet.
 Granulatet bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 80 mL.

För licensprodukterna Sobelin Granulat och Clindamycin Pfizer anges att vattnet ska tillsättas i två omgångar (2 x 30 mL) och att flaskan ska skakas mellan tillsättningarna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för klindamycin

Nyfödda

Doseringsintervall beror på gestationsålder och postnatal ålder:

Postnatal ålder 0 - 7 dagar:

Oavsett gestationsålder vid födsel: 5 mg/kg x 3

Postnatal ålder 8 - 28 dagar:

Gestationsålder vid födsel mindre än vecka 33: 5 mg/kg x 3

Gestationsålder vid födsel från vecka 33: 5 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år

Normaldos: 5 - 8 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Högdos:

(allvarlig infektion samt vid mindre känsliga bakterier enl resistensbestämning)

7,5 - 10 mg/kg x 4, max 600 mg/DOS

Akut streptokocktonsillit, vid recidiv inom 4 veckor samt vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Behandlingstid: 10 dagar

Endokarditprofylax, alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år:

Engångsdos 30 - 60 min före ingrepp: (15 -) 20 mg/kg, max 600 mg

Impetigo, sårinfektioner, erysipelas, stjärtfluss, preseptal cellulit; alternativ vid penicillinallergi

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Behandlingstid: 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling vid skelettinfectioner så som osteomyelit, septisk artrit och spondylodiskit, dock ej vid infektion orsakad av Kingella kingae eller Haemophilus influenzae. Alternativ vid penicillinallergi.

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 3, max 300 mg/DOS

Total behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling: minst 4 veckor





Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3

Clindamycin Palm. Hyd.		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
75 mg/5 mL	+		=	15 mg/mL
1 flaska		75 mL		100 mL

Beredningsinstruktion:

Vänd flaskan några gånger innan vattnet tillsätts för att lösgöra granulatet. Tillsätt en stor del av vattnet och skaka flaskan ordentligt. Tillsätt sedan resterande volym av vattnet och skaka flaskan igen.

Granulatet bidrar med volym vilket gör att slutvolymen blir 100 mL.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin. Långvarig eller upprepad kontakt kan i sällsynta fall ge upphov till allergiska reaktioner.

ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Klindamycin oralt 15 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
5 mg/kg	0,33 mL	1,67 mL	3,33 mL	16,67 mL
7,5 mg/kg	-	2,5 mL	5 mL	25 mL
15 mg/kg	-	5 mL	10 mL	-
max 300 mg/DOS	-	-	-	20 mL
max 600 mg/DOS	-	-	-	40 mL

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/>

Internetadress Kloka Listan

<https://klokalistan.se/>

Internetadress VGR, Alfresco - Endokarditprofylax på barn

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su9805-1593997-2518/surrogate/Endokarditprofylax%20p%20a5%20barn.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid faryngotonsillit

www.lakemedelsverket.se/faryngotonsillit

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Neonatal Sepsis

www.lakemedelsverket.se/neonatal-sepsis

Läkemedelsverket Särskilt tillstånd - klindamycin granulat till oral lösning

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/tillstand-for-utlamnande-vid-generell-licens/klindamycin--sarskilt-tillstand>

NeoFax

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp. En systematisk litteraturöversikt 2010

<http://www.sbu.se/contentassets/bfd8f676b4ed409898523fabecefab19/antibiotikaprofylax.pdf>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barninfektionsförening - Led- och skelettinfektioner hos barn

<https://inf.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>





Klindamycin oralt 15 mg/mL

(ex Dalacin) oral lösning

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Clindamycin Palm. Hyd. (licensprodukt)

75 mg/5 mL, Granulat till oral lösning

Förvaras i rumstemperatur.

15 mg/mL, Oral lösning

Färdigspädd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur.

Klindamycin (registrerad produkt)

15 mg/mL, Granulat till oral lösning

Förvaras i rumstemperatur.

15 mg/mL, Oral lösning

Färdigspädd lösning är hållbar i 2 veckor. Förvaras i rumstemperatur. Gäller även licensprodukter.

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2573

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2573

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 7

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-06-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT