



Vätskebehandling enteralt

(ex bröstmjolk, majsavlling) underhåll 24 tim

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Vätskebehandling underhåll, efter den akuta uppvätskningsfasen.

Barn under 6 mån: bröstmjolk/bröstmjolk ersättning

Barn från 6 mån: majsavlling alt. allergivänligt alternativ

Kan vid behov blandas med vätskeersättning, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Enteralt: Doserna är beräknade utifrån 24 tim, men faktisk administreringstid beror på patientens tillstånd.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Underhållsvätska

Mängd vätska per 24 tim beräknas utifrån kroppsvikt:

0 - 6 kg: 150 mL/kg

7 - 20 kg: 6 x 150 mL + 50 mL/kg för varje kg över 6 kg

Över 20 kg: 6 x 150 mL + 14 x 50 mL + 20 mL/kg för varje kg över 20 kg

0 - 6 kg: 150 mL/kg

7 - 20 kg: 900 mL + 50 mL/kg över 6 kg

Över 20 kg: 900 mL + 700 mL + 20 mL/kg över 20 kg

Utöver detta lägg till 10 mL/kg för varje diarré.

Uträkningsexempel (utan hänsyn till ev diarré):

Vikt 12 kg: 900 mL + 6 x 50 mL = 1200 mL/24 tim

Vikt 23 kg: 900 mL + 700 mL + 3 x 20 mL = 1660 mL/24 tim

REFERENS/LÄNK

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2899

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2899

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-04-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT