



Prednisolon-natriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning av pulver till injektionsvätska 25 mg (Precortalon aquosum, Prednisolon Ebb)
Båda produkterna innehåller prednisolon-natriumsuccinat 25 mg/mL =
prednisolon 18,66 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING

Prednisolon natriumsuccinat	Sterilt Vatten		INJ LÖ
25 mg	+	=	25 mg/mL
1 st	1 mL		1 mL

Beredningsinstruktion:

Snurra försiktigt tills lösningen är klar.

Den ordinerade dosen kan spädas vidare med NaCl 9 mg/mL för att ges som intravenös infusion.

ADMINISTRERING

Intravenös injektion: 1 - 15 min

IntraTEKAL injektion

RIMLIG DOS för Prednisolon-natriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,67 mg/kg	-	0,13 mL	0,27 mL	1,34 mL
2,68 mg/kg	-	0,54 mL	1,07 mL	5,36 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Prednisolon natriumsuccinat (registrerad produkt)

25 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur. Får ej sparas, används direkt efter iordningställande.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Observera att styrkan på den intravenösa produkten avser prednisolon-natriumsuccinat och inte prednisolon.

Dos i prednisolon-natriumsuccinat = dos i prednisolon x 1,34

	Prednisolon-natriumsuccinat	Prednisolon
Barn 1 mån - 18 år:	0,67 - 2,68 mg/kg x 1	0,5 - 2 mg/kg x 1
Max:	54 (- 80) mg/dygn	40 (- 60) mg/dygn

Vid högdosbehandling (över 20 mg/dygn) kan dygnsdosen delas upp på två dostillfällen. Max behandlingstid är 6 veckor.

Nedtrappningsschema (enl. BLFs behandlingsrekommendation för IBD):

- Vid doser över 30 mg/dygn ska dygnsdosen varje vecka sänkas med 10 mg.
- Vid doser 10 - 30 mg/dygn ska dygnsdosen varje vecka sänkas med 5 mg.
- Vid doser under 10 mg/dygn ska dygnsdosen varje vecka sänkas med 2,5 mg.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Ordineras som del i trippelbehandling via ordinationsstöd för cytostatika, se enskilt protokoll.

ÖVRIG INFORMATION

Doseringen för prednisolon skiljer sig utifrån beredningsform.

Tänk på att ta hänsyn till konverteringsfaktorn (1,34) vid:

- Övergång från oral till intravenös behandling:
Dos i prednisolon x 1,34 = Dos i prednisolon-natriumsuccinat
- Övergång från intravenös till oral behandling:
Dos i prednisolon-natriumsuccinat/1,34 = Dos i prednisolon

Beakta andra tillstånd som kan påverkas av behandlingen med kortison, t ex tuberkulos, psykisk sjukdom, magsår och diabetes. Konsultera specialist vid behov.

Prednisolon-natriumsuccinat saknar konserveringsmedel.



Prednisolon-natriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL

(ex Precortalon aquosum)



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NOPHO protokoll ALL TOGETHER

A Treatment study protocol of the ALL Together Consortium for children and young adults (1-45 years of age) with newly diagnosed acute lymphoblastic leukaemia (ALL)

<http://www.nopho.net>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/varprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa Akkawi El-Edelbi

ePedID: 2965

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-04-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT