



Esketamin oralt 25 mg/mL

(ex Ketanest)

Injektionsvätska för ORALT bruk.

Använd med försiktighet vid intrakraniell hypertension.

Noggrann övervakning av andning krävs.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Injektions-infusionsvätska lösning 25 mg/mL, för ORALT bruk.

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN
25 mg/mL
flera volymer finns

ARBETSMILJÖ

Använd handskar vid hantering. Esketamin kan absorberas genom huden och ge upphov till påverkan på det centrala nervsystemet samt det kardiovaskulära systemet.

ADMINISTRERING

Oralt: Administreras ca 45 min innan procedur. Tid till maximal effekt 35 - 45 min. Effekten kommer något senare jämfört med nasal tillförsel.

Blandas i saft eller dylikt då lösningen har en bitter smak.

RIMLIG DOS för Esketamin oralt 25 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,5 mg/kg	-	0,1 mL	0,2 mL	1 mL
1 mg/kg	-	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
2 mg/kg	-	0,4 mL	0,8 mL	4 mL
2,5 mg/kg	-	0,5 mL	1 mL	5 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Esketamin (registrerad produkt)

25 mg/mL, Injektionsvätska, för oralt bruk

Förvaras i rumstemp. Får inte frysas. Esketamine Orifarm är ljuskänsligt, förvaras i originalförpackningen. Bruten ampull bör användas direkt. Vid behov kan kvarvarande volym förvaras uppdragen i märkt oral spruta 24 tim i kylskåp alt 12 tim i rumstemp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärtlindring inför procedur

Barn 3 mån - 18 år: 1,5 - 2,5 mg/kg

Smärtlindring inför procedur, i kombination med annat sederande läkemedel

Barn 3 mån - 18 år: 0,5 - 1,5 mg/kg

ÖVRIG INFORMATION

Viss risk finns för obehagliga upplevelser i form av hallucinationer och sinnesförändringar vid oral administrering av esketamin. Risken är dock lägre än vid intravenös administrering.

Esketamin kan ge en ökad salivering vilket innebär att fria luftvägar behöver säkerställas.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

PubMed PMID Smith HAB et al. 2022 Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guidelines on Prevention and Management of Pain, Agitation, Neuromuscular Blockade, and Delirium in Critically Ill Pediatric Patients. *Pediatr Crit Care Med*. 2022 Feb 1;23(2)

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35119438>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 3016

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-09

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT