



Budesonid oralt

(ex Entocort)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depotkapsel 3 mg (ex Entocort)
Depottablett 9 mg (Cortiment)
Enterokapsel 3 mg (Budenofalk)
Enterogranulat 9 mg (Budenofalk)

ADMINISTRERING

Oralt:

Depotkapslarna, depottabletterna samt enterogranulatet ska sväljas hela och intas på morgonen.

Depottabletterna får inte krossas eller tuggas.

Enterokapslarna samt enterogranulatet tas ca 30 min innan måltid.

Enterogranulatet läggs på tungan och sväljes helt, med mycket vätska. Granulatet får inte tuggas eller krossas.

Vid sväljsvårigheter kan depotkapseln öppnas och innehållet blandas i vatten, eller annan dryck med pH under 5,5 som t.ex. äppeljuice eller apelsinjuice, för omedelbar administrering. Kornen får inte tuggas eller krossas.

Enteralt:

Depotkapselns innehåll kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering i t.ex. PEG. Vid administrering i tunn sond finns stor risk för ocklusion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Budesonid (registrerad produkt)

9 mg, Depottablett

Förvaras vid högst 30 °C.

9 mg, Enterogranulat

Förvaras i rumstemperatur.

3 mg, Depotkapsel, hård

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i rumstemperatur.

3 mg, Enterokapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Aktiv, mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och colon ascendens

Vid feber, påfrestningar och andra stressituationer kan dosen behöva höjas, alternativt kan ett tillägg av systemisk glukokortikosteroid ges.

Depotkapsel/depottablett, barn från 8 år:

(3 -) 9 mg x 1 på morgonen i 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

Enterokapsel, barn från 8 år:

(3 -) 9 mg x 1 alt. 3 mg x 3 i 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

Enterogranulat, barn från 8 år:

9 mg x 1 på morgonen i 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

ÖVRIG INFORMATION

Behandlingen bör ej överstiga 3 månader, långtidsbehandling med budesonid rekommenderas inte.

Budesonid kan hämma tillväxt hos barn och ungdomar. Kontroll av längdtillväxt rekommenderas.

Nedsatt leverfunktion leder till att den systemiska biotillgängligheten ökar för budesonid.

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med infektioner, diabetes mellitus, magsår, osteoporos, hypertension, glaukom eller katarakt samt patienter med arvet för diabetes eller glaukom.

Mässhing och vattkoppor kan få ett förvärrat förlopp hos en patient som behandlas med orala glukokortikosteroider, försiktighet bör iakttas så att patienten inte smittas av dessa sjukdomar under behandlingstiden.



Budesonid oralt

(ex Entocort)



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Micromedex

PubMed PMID Escher JC; European Collaborative Research Group on Budesonide in Paediatric IBD. Budesonide versus prednisolone for the treatment of active Crohn's disease in children: a randomized, double-blind, controlled, multicentre trial. Eur J Gastroenterol Hepato

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095852>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3177

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-05-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT