



kloNazepam oralt

(ex Iktorivil) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 0,5 mg och 2 mg (Iktorivil, Rivotril licens)

Klonazepam finns även som orala droppar 2,5 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Tablett 0,5 mg kan delas i två lika stora doser.

Tablett 2 mg har krysskåra och kan delas i två eller fyra lika stora doser.

Oralt

Enteralt:

Tabletterna kan slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klonazepam (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen, ljuskänsligt. Gäller båda styrkorna, även licensprodukter.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

För doser under 0,25 mg bör orala droppar användas, se annan instruktion.

Epileptiska anfall, epilepsi

Barn 1 mån - 18 år:

Initial dos: förslagvis 0,01 - 0,02 mg/kg/DYGN, max 1 mg/DYGN

Titra sedan upp till lägsta möjliga effektiva dos för att undvika biverkningar.

Vanlig underhållsdos: 0,05 mg/kg/DYGN

Dygnsdosen ska delas upp på 2 - 4 doseringstillfällen.

Exempel på doser per tillfälle:

0,01 mg/kg/DYGN = 0,005 mg/kg x 2 eller 0,0033 mg/kg x 3

0,05 mg/kg/DYGN = 0,025 mg/kg x 2 eller 0,0167 mg/kg x 3

Krampprofylax i samband med busulfankonditionering

Barn under 10 kg: 0,1 mg x 3

Barn 10 - 29 kg: 0,2 mg x 3

Barn 30 - 49 kg: 0,25 mg x 3

Barn från 50 kg: 0,5 mg x 3

I vissa konditioneringsscheman dubblas dosen ovan.

Behandlingen påbörjas kvällen innan eller från första busulfan-dagen och pågår till och med dagen efter avslutad behandling med busulfan. Följ lokal riktlinje i första hand.



kloNAzepam oralt

(ex Iktorivil) tabletter



ÖVRIG INFORMATION

Hos spädbarn och små barn kan klonazepam orsaka hypersalivation eller bronkiell hypersekretion, viktigt att säkerställa att luftvägarna hålls öppna.

Erfarenhetsmässigt är doseringen i produktresumén för klonazepam väl hög och medför större risk för biverkningar.

Antidot flumazenil (f.d Lanexat). OBS - flumazenil är olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

NeoFax

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3360

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Inghela Rydén

ePedID: 3360

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-10-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT