



Terbutalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

(Bricanyl)

EN-STEGSSPÄDNING

Bricanyl 0,5 mg/mL 1 mL	+	Glukos 50 mg/mL 24 mL	=	INF 20 mikrog/mL 25 mL
-------------------------------	---	--------------------------	---	------------------------------

ADMINISTRERING

Alternativ till kontinuerlig nebulisering för barn 1 mån - 5 år

Intravenös infusion (kontinuerlig)

RIMLIG DOS för Terbutalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mikrog/kg/tim	-	0,75 mL/tim	1,5 mL/tim	7,5 mL/tim
5 mikrog/kg/tim	-	1,25 mL/tim	2,5 mL/tim	12,5 mL/tim

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Bricanyl (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning

Förvaras i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Förvaras vid högst 25 °C. Bruten ampull får inte sparas.

20 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

Färdigspädd lösning hållbar 12 tim i rumstemp. Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens Hållbarhetsinformation.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Akut astma - tilläggsbehandling till patient som inte svarat på inhalerad luftrörsvidgande behandling och kortison

Barn 1 mån - 5 år: 3 - 6 mikrog/kg/tim

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Micromedex

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer

Allergi - Akut astma

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5054

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-12-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT