



Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL

(f.d Dormicum)

Noggrann övervakning av andning och beredskap för att ventilera patienten krävs.

INGEN SPÄDNING

IM INJ
5 mg/mL
1 mL

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion

RIMLIG DOS för Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,2 mg/kg, max 10 mg	-	0,2 mL	0,4 mL	2 mL
0,3 mg/kg, max 10 mg	-	0,3 mL	0,6 mL	2 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Midazolam. (registrerad produkt)

5 mg/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Förvaras i rumstemperatur i ytterkartongen, ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kan ge andningsdepression. Adekvat andningsövervakning ska alltid finnas.

Status epileptikus, alternativ när intravenös infart saknas

Barn 1 mån - 18 år:

STEG 1

0,2 - 0,3 mg/kg = 200 - 300 MIKROG/kg, max 10 mg

STEG 2

Upprepa dosen ovan om fortsatt anfall efter 3 - 4 min.

Om fortsatt anfall efter 2 doser ges fortsatt behandling vanligen intraosseöst eller intravenöst, se annan instruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Bolusinjektion midazolam har kort halveringstid och därför ordinerar ofta efterföljande infusion för att förhindra ytterligare anfall, särskilt om flera bolusinjektioner behövs.

Midazolam metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig administrering av andra läkemedel som påverkar detta enzym kan midazolamdosen behöva justeras.

Antidot flumazenil (f.d Lanexat). Flumazenil är dock olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress VGR, Alfresco - Status epilepticus hos barn och ungdomar

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SU9774-1570060579-322/SURROGATE/Status%20epilepticus%20hos%20barn%20och%20ungdomar.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Läkemedel vid epilepsi

www.lakemedelsverket.se/behandling-epilepsi

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



Midazolam intramuskulär inj 5 mg/mL (f.d Dormicum)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5211

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-12-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT