



FlutikasonFUROAT + Vilanterol inhalation

(Relvar Ellipta) inhalationspulver

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kombinationspreparat innehållande flutikasonfuroat och vilanterol.
Första styrkeangivelsen avser flutikasonfuroat.

Inhalationspulver (Relvar Ellipta)
92 + 22 mikrog/inh
184 + 22 mikrog/inh

ADMINISTRERING

Inhalation: Skölj munnen efter administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flutikasonfuroat + Vilanterol (registrerad produkt)

Inhalationspulver

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen, fuktkänsligt. Vid förvaring i kylskåp ska inhalatorn anta rumstemperatur under minst en timme innan användning. Öppnad förpackning hållbar 6 veckor. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Underhållsbehandling av obstruktiv bronkit/astma

Första styrkeangivelse avser mängd flutikasonfuroat.

Barn 12 - 18 år
Medelhög dos: 92/22 mikrog x 1
Hög dos: 184/22 mikrog x 1

Titreras till lägsta effektiva dos.

ÖVRIG INFORMATION

FlutikasonFUROAT är en inhalationssteroid (ICS) som inte ska förväxlas med flutikasonPROPIONAT. FlutikasonFUROAT 100 mikrog motsvarar ungefär flutikasonPROPIONAT 500 mikrog.

Vilanterol är en beta-2-receptoragonist med långverkande effekt (LABA). Läkemedlet har 15 minuters anslagstid och 24 timmars effektduration. Observera att vilanterol ska användas som underhållsbehandling och inte vid behov, varken enskilt eller i kombination med en inhalationssteroid.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Tillväxthastigheten kan påverkas första 1 - 2 åren efter insättning av behandling med inhalationssteroid. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.





FlutikasonFUROAT + Vilanterol inhalation

(Relvar Ellipta) inhalationspulver

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna

www.lakemedelsverket.se/astma

PubMed PMID Loke YK et al. Impact of Inhaled Corticosteroids on Growth in Children with Asthma: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26191797/>

PubMed PMID Zhong Y et al. Quantitative comparison of dose-effect and time-course of fluticasone furoate and fluticasone propionate in adult and adolescent patients with persistent asthma: A systematic review and meta-analysis. Respiriology. 2022

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35043513/>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer

Allergi - Astma, underhållsbehandling

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Hanna Gottlieb

ePedID: 5299

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-06-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT