



Fosfat oralt 120 mg/mL = 1,26 mmol/mL

(Extempore) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Oral lösning 120 mg/mL fosfat (PO_4^-) = 39 mg/mL fosfor (P) = 1,26 mmol/mL (extempore)

Kan beställas som konserverad oral lösning (i 300 mL-flaska) eller steril, okonserverad oral lösning (i 30, 60 eller 100 mL-flaska).

Konserverad oral lösning ska inte ges till nyfödda då natriumbensoat ingår som konserveringsmedel och detta kan öka risken för guldot hos nyfödda barn. Okonserverad lösning eller kapslar rekommenderas, se annan instruktion.

INGEN SPÄNDNING

ORAL LÖSN
120 mg/mL
flera volymer finns

ADMINISTRERING

Ska ej ges tillsammans med oralt kalcium, magnesium eller oralt järn, pga komplexbindning mellan dessa joner. Därför bör tidsintervallet vara minst 2 timmar mellan intag av dessa preparat.

Oralt

Enteralt

RIMLIG DOS för Fosfat oralt 120 mg/mL = 1,26 mmol/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,3 mmol/kg = 30 mg/kg	0,25 mL	1,25 mL	2,5 mL	12,5 mL
0,4 mmol/kg = 40 mg/kg	-	1,67 mL	3,33 mL	16,67 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fosfat (lagerberedning)

120 mg/mL, Oral lösning

Konserverad lösning: Förvaras i högst 25 °C. För infektionskänslig patient hållbar 1 mån efter första uttag, annars 6 mån. Okonserverad lösning: Förvaras i högst 25 °C. Öppnad flaska hållbar 7 dygn vid förvaring i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Osteopeniprofylax hos nyfödda med födelsevikt lägre än 1500 g

Barn som får OBERIKAD bröstmjölk

Startdos: ca 0,3 mmol/kg x 2 (30 mg/kg x 2)

Underhållsdos:

Normalintag: ca 0,6 mmol/kg x 2 (60 mg/kg x 2)

Vid behov av högre doser* rekommenderas användning av okonserverad oral lösning eller kapsel fosfat, se annan instruktion. Detta då mängderna konserveringsmedel blir för höga med konserverad oral lösning.

*Med högre doser menas ett dygnsintag av 3,5 - 4,5 mmol/kg/dygn. Detta kan behövas vid konstaterad raktit eller S-Fosfat lägre än 1,6 mmol/L.

Osteopeniprofylax hos nyfödda med födelsevikt lägre än 1500 g

Barn som får delvis BERIKAD bröstmjölk (se Övrig information)

Startdos: ca 0,3 mmol/kg x 2 (30 mg/kg x 2)

Underhållsdos:

Normalintag: ca 0,3 mmol/kg x 2 (30 mg/kg x 2)

Vid behov av högre doser* rekommenderas användning av okonserverad oral lösning eller kapsel fosfat, se annan instruktion. Detta då mängderna konserveringsmedel blir för höga med konserverad oral lösning.

*Med högre doser menas ett dygnsintag av 3,5 - 4,5 mmol/kg/dygn. Detta kan behövas vid konstaterad raktit eller S-Fosfat lägre än 1,6 mmol/L.





Fosfat oralt 120 mg/mL = 1,26 mmol/mL

(Extempore) oral lösning

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypofosfatemi t. ex. efter Foscarnetbehandling

Dos styrs av S-Fosfat:

S-Fosfat under 0,48 mmol/L:

starta med 1,3 mmol/kg/dygn fördelat på 3 - 4 doser.

S-Fosfat från 0,48 mmol/L:

1 mmol/kg/dygn fördelat på 3 - 4 doser.

I praktiken ges oftast 3 doser per dygn så att barnet får sova på natten:

1,3 mmol/kg fördelat på 3 doser = ca 0,4 mmol/kg x 3 (40 mg/kg x 3)

1 mmol/kg fördelat på 3 doser = ca 0,3 mmol/kg x 3 (30 mg/kg x 3)

Nyfödda: max 48 mmol/DYGN (38 mL/DYGN)

Barn 1 mån - 4 år: max 48 mmol/DYGN (38 mL/DYGN)

Barn 5 - 18 år: max 97 mmol/DYGN (77 mL/DYGN)

ÖVRIG INFORMATION

Med delvis berikad bröstmjölk menas t ex tillsats av 2 g PreNAN HMF/100 mL bröstmjölk eller tillsats av 1 påse Nutriprem/100 mL bröstmjölk.

Vid indikationen osteopeniprofylax sker avslut av behandlingen för majoriteten av barn när barnet får fullberikad bröstmjölk eller prematurformula eller när de inte längre sondmatas. Om diagnostiseras raktit sker avslut när röntgen normaliseras, dock som längst till 2 mån korrigeras ålder.





Fosfat oralt 120 mg/mL = 1,26 mmol/mL

(Extempore) oral lösning

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress APL, Apotekens Produktion och Laboratorier

<http://www.apl.se>

janusinfo.org Janusmed interaktioner

<https://janusmed.se/interaktioner?nsIIds=IDE4POE6U9ZO7VERT1&nsIIds=IDE4POE6U9ZNDVERT1&nsIIds=IDE4POC5U99XBVERT1&nsIIds=IDE4POEEUA5F5VERT1>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Osteopeni

<http://neo.barnlakforeningen.se/riktlinjer-vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5326

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2024-05-13

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT