



Kolkicin oralt

(ex Colrefuz) tablett/kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 500 mikrog = 0,5 mg (ex Colrefuz)

Kapsel 0,25 mg (extempore)

ARBETSMILJÖ

Möjlig risk för fosterskador, hantera enligt lokal rutin. Gäller framförallt vid krossning/delning av tablett.

ADMINISTRERING

Oralt: Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten eller blandas med mjuk mat i direkt anslutning till administrering. Kapslarna bör sväljas hela.

Vid gastrointestinala biverkningar kan det vara en fördel att ge dygnsdosen uppdelat på två tillfällen.

Enteralt: Tabletten kan krossas och slammas upp i vatten i direkt anslutning till administrering. Tabletten kan vara svårslöslig och det kan ta upp till några minuter för upplösning.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Kolkicin (registrerad produkt)

0,5 mg, Tablett

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

Kolkicin (extempore)

0,25 mg, Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med specialist inom respektive terapiområde.

Dosökning bör övervakas noggrant med avseende på biverkningar.

Noggrann övervakning krävs om patienten har nedsatt njur- eller leverfunktion, se Övrig information.

Postoperativ perikardeffusion som tillägg till NSAID/ASA

Barn 1 mån - 4 år: startdos 0,5 mg x 1, alternativt 0,25 mg x 2

Barn 5 - 10 år: startdos 1 mg x 1, alternativt 0,5 mg x 2

Barn 11 - 18 år: startdos 1,5 mg x 1, alternativt 0,75 mg x 2

Kan titreras upp i steg om 0,25 mg/DYGN, fördelat på 1 - 2 doseringstillfällen, till önskad effekt. Maxdos 2 mg/DYGN.

Rekommenderad behandlingstid: 3 månader

Familjär medelhavsfeber

Barn 1 mån - 4 år: startdos 0,5 mg x 1, alternativt 0,25 mg x 2

Barn 5 - 10 år: startdos 1 mg x 1, alternativt 0,5 mg x 2

Barn 11 - 18 år: startdos 1,5 mg x 1, alternativt 0,75 mg x 2

Kan titreras upp i steg om 0,25 mg/DYGN, fördelat på 1 - 2 doseringstillfällen, till önskad effekt. Maxdos 2 mg/DYGN.



Kolkicin oralt

(ex Colrefuz) tablett/kapsel

ÖVRIG INFORMATION

Kolkicin har smalt terapeutiskt fönster och är extremt toxiskt vid överdos. Ring alltid Giftinformationscentralen vid överdosering.

Samtidig behandling med kolkicin och flera andra läkemedel, främst CYP3A4-hämmare eller P-gp-hämmare har visat sig öka risken för kolkicintoxicitet. Om en patient har fått samtidig behandling med en måttlig eller stark CYP3A4-hämmare eller en P-gp-hämmare, ska patienten övervakas noggrant med avseende på biverkningar och dosen av kolkicin eventuellt sänkas. (Se t.ex. <https://janusmed.se/interaktioner> (klickbar))

Reducera den initiala dosen med 50 % vid lätt eller måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion. OBS! Kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion.



Kolkicin oralt

(ex Colrefuz) tablett/kapsel



REFERENS/LÄNK

APL databas (AIDA)

<https://www.apl.se>

Bok Don't Rush to Crush. The Society of Hospital Pharmacists of Australia. Fourth edition, 2021.

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kinderformularium

<https://www.kinderformularium.nl>

Internetadress NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings, 2016.

<https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf>

Internetadress Pediatric Infective Pericarditis Treatment & Management

<https://emedicine.medscape.com/article/897899-treatment?form=fpf>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

PubMed PMID Bustaffa M et al. Long-term efficacy and safety of colchicine and anti-IL-1 blockers in FMF: results from the Eurofever multicenter observational study. J Autoimmun. 2025 May

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40252570>

PubMed PMID Ju Hee Shin et al. Colchicine for steroid-resistant recurrent pericarditis in a child. 2018 Dec.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31620598>

PubMed PMID Lisa K Stamp et al. Colchicine: the good, the bad, the ugly and how to minimize the risks. Rheumatology (Oxford), 2024 Apr.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38019947>

PubMed PMID Nicholas C et al. Management of Idiopathic Viral Pericarditis in the Pediatric Population. J Pediatr Pharmacol Ther. 2022 Sep.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36186249>

PubMed PMID Samer Alabed et al. Colchicine for children with pericarditis: systematic review of clinical studies. 2016 Oct.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27083755>

PubMed PMID Yin X et al. Interventions for reducing inflammation in familial Mediterranean fever. Cochrane Database Syst Rev. 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35349164>



Kolkicin oralt

(ex Colrefuz) tablett/kapsel



Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5349

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 5349

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-06-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT