



# Droperidol intramuskulär inj 2,5 mg/mL

(ex Dridol)

## INGEN SPÄDNING

IM INJ  
2,5 mg/mL  
1 mL

## ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Droperidol (registrerad produkt)

2,5 mg/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

### Akut agitation då oral medicinering inte kan användas

Ges vanligen i kombination med prometazin intramuskulärt. Detta minskar risken för akut dystoni och extrapyramidala biverkningar, och ger ytterligare sederande effekt.

Barn 13 - 15 år: 2,5 mg

Barn 16 - 18 år: 2,5 - 5 mg

Dosen kan behöva upprepas efter ca 30 min. Får endast upprepas en gång.

## REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Farmakainstruktion BUP Stockholm 2024

[https://www.bup.se/49e164/contentassets/c5b865fe86d44fbd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm\\_.pdf](https://www.bup.se/49e164/contentassets/c5b865fe86d44fbd957c9d71eaaeadbe/farmakainstruktion-bup-stockholm_.pdf)

PubMed PMID Ramsden SC et al: A systematic review of the effectiveness and safety of droperidol for pediatric agitation in acute care settings. Acad Emerg Med 2022

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35490341>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

## EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 5376

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-10-29

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT