



Klorokin oralt

(ex Resochin licens) tabletter

Kan förlänga QT-intervallet, se Övrig information.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 100 mg (A-CQ 100 Chloroquine, licens)
Tablett 155 mg (Resochin, licens)
Tablett 250 mg (Avlocor, licens)

OBS - för A-CQ 100 Chloroquine och Resochin anges tabletternas styrka i klorokinbas, för Avlocor avser styrkeangivelsen klorokinfosfat.

100 mg klorokinBAS motsvarar 161 mg klorokinFOSFAT.
155 mg klorokinBAS motsvarar 250 mg klorokinFOSFAT.

KlorokinFOSFAT finns som oral suspension 15 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Tablett A-CQ 100 Chloroquine och Avlocor har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.

Tablett Resochin saknar brytskåra.

Oralt

Enteralt: Användning av klorokinFOSFAT oral suspension rekommenderas, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Klorokin (licensprodukt)

100 mg, Tablett

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen, ljus- och fuktkänsligt.

155 mg, Filmdragerad tablett

Förvaras i rumstemperatur.

250 mg, Tablett

Förvaras vid högst 30 °C i originalförpackningen, ljus- och fuktkänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Doserna nedan avser klorokinBAS, motsvarande dos i klorokinFOSFAT står i parentes.

Profylax mot malaria (ej 1:a handsval)

Kan vara ett alternativ vid resa till område utan klorokinresistens.

Doseras en gång per vecka.

Barn 1 mån - 18 år: 5 mg/kg (8 mg/kg)

Behandling bör starta senast ankomstdagen till område med malaria och fortsätta i 4 veckor efter avresa från det området.

Behandling av malaria

Ordineras i samråd med infektionsspecialist.

Barn 1 mån - 18 år:

Dos 1: 10 mg/kg, max 620 mg (16 mg/kg, max 1000 mg)

Dos 2: 5 mg/kg, max 310 mg, 6 tim efter dos 1 (8 mg/kg, max 500 mg)

Dos 3: 5 mg/kg, max 310 mg, 24 tim efter dos 1 (8 mg/kg, max 500 mg)

Dos 4: 5 mg/kg, max 310 mg, 48 tim efter dos 1 (8 mg/kg, max 500 mg)

ÖVRIG INFORMATION

Klorokin kan ge QT-förlängning, vilket ökar risken för t.ex. torsade de pointes.

Förlängningen är dosberoende och klorokin ska ges med försiktighet till patienter med andra riskfaktorer för QT-förlängning (ex andra QT-förlängande läkemedel).

Klorokin kan ge upphov till svår hypoglykemi.

Klorokin oralt

(ex Resochin licens) tabletter



REFERENS/LÄNK

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) A-CQ 100 Chloroquine, tablett 100 mg

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h106659_smpc.pdf

Summary of Product Characteristics (SPC) Avlocor tablett 250 mg

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rhs8136-160155217-518/native/SPC%20AVLOCOR%20250MG%20vnr%20848842.pdf>

Summary of Product Characteristics (SPC) Resochin tablett 155 mg

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/15797/FT_15797.html

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5410

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-04-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT