



Posakonazol oralt 100 mg

(ex Noxafil) tablett

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Enterotablett 100 mg (ex Noxafil)

Posakonazol finns även som oral suspension 40 mg/mL, se annan instruktion.

OBS - tablett och oral suspension är INTE UTBYTBARA med varandra och de har olika dosering.

ADMINISTRERING

Oralt:

Enterotabletten ska sväljas hel, får inte krossas, tuggas eller delas. Kan tas med eller utan mat.

Vid sväljsvårigheter rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

Enteralt:

Använd oral suspension, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Posakonazol (registrerad produkt)

100 mg, Enterotablett

Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

OBS - Tabletten är INTE UTBYTBAR mot oral suspension. Tabletten har högre biotillgänglighet och ger högre plasmakoncentration än oral suspension, både med och utan föda.

Invasiva mykoser, behandling och proylax

Barn från 6 år:

Dag 1: 300 mg x 2

Från dag 2: 300 mg x 1

Aspergillus infektion eller allergisk bronko-pulmonell aspergillos (ABPA) hos patienter med cystisk fibros

Barn 6 - 11 år:

Dag 1: 300 mg x 2

Från dag 2: 300 mg x 1

Barn 12 - 18 år:

Dag 1: 400 mg x 2

Från dag 2: 400 mg x 1

Behandlingstid: vanligen 6 - 12 veckor beroende på klinisk respons

ÖVRIG INFORMATION

Elektrolytnivåer, speciellt kalium, magnesium och kalcium, ska följas och vid behov korrigeras före och under behandlingen.

Posakonazol är en potent hämmare av enzymet CYP3A4, vilket medför risk för interaktion med andra läkemedel som metaboliseras via detta enzym. Vid samtidig behandling med takrolimus behöver dosen takrolimus oftast reduceras till ca en tredjedel av den ursprungliga dosen.

(Se t.ex. <https://janusmed.se/interaktioner> (klickbar))

Samtidig behandling med vinkristin har resulterat i neurotoxicitet samt andra allvarliga biverkningar. Posakonazol har lång halveringstid och ska därför senast sättas ut (2 -) 3 dagar före och/eller sättas in tidigast (2 -) 3 dagar efter vinkristinbehandling.



Posakonazol oralt 100 mg

(ex Noxafil) tablett



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Royal Brompton Hospital - Care of Children with Cystic Fibrosis

<https://www.rbht.nhs.uk/childrencf>

Micromedex

PubMed PMID Bentley S et al. Clinical pharmacokinetics and dose recommendations for posaconazole gastroresistant tablets in children with cystic fibrosis. J Antimicrob Chemother. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34458906>

PubMed PMID Döring M et al. Efficacy, safety and feasibility of antifungal prophylaxis with posaconazole tablet in paediatric patients after haematopoietic stem cell transplantation. J Cancer Res Clin Oncol. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28258343>

PubMed PMID Patel D et al. Posaconazole therapy in children with cystic fibrosis and Aspergillus-related lung disease. Med Mycol. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30877757>

PubMed PMID Wass EN et al. Comparison of the efficacy of posaconazole delayed release tablets and suspension in pediatric hematology/oncology patients. J Pediatr Pharmacol Ther. 2020

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31897075>

PubMed PMID Weerdenburg H et al. Crushed posaconazole delayed-release tablets for antifungal prophylaxis and treatment in children. J Antimicrob Chemother. 2024

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39475156>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 5415

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-05-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT