



Mesna oralt

(Uromitexan) tabletter

Anafylaxiberedskap ska finnas.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 400 och 600 mg (Uromitexan)

ADMINISTRERING

Oralt:

Vid sväljningssvårigheter kan tablett krossas och slammas upp i vatten eller blandas med yoghurt eller mjuk kall mat i direkt anslutning till administrering.

Enteralt:

Tablett kan krossas och slammas upp i vatten för omedelbar administrering. OBS - vid ofullständig krossning kan bitar av dragering orsaka stopp i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Mesna (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid beräkning av antal tabletter som ska ges, ska antalet tabletter avrundas till närmaste hela tabletter.

OBS! Dosen för mesna skiljer sig mellan intravenös och oral behandling. För dosering av intravenöst mesna, se annan instruktion.

Profylax mot hemorragisk cystit vid cyklofosfamid eller ifosfamidbehandling, barnonkologi

Barn: Dos beroende på behandlingsprotokoll.

Profylax mot hemorragisk cystit vid cyklofosfamidbehandling vid njursjukdom

Första dosen ska ges intravenöst, omedelbart före cyklofosfamiddosen, se annan instruktion.

Doserna vid timme 4 och 8 kan ges intravenöst eller oralt. Följ lokal rutin.

Barn: Dos enligt behandlingsprotokoll.

Profylax mot hemorragisk cystit vid cyklofosfamidbehandling vid: Systemisk lupus erythematosus (med allvarligt organengagemang i CNS eller njurar)

Vaskuliter inklusive CNS-vaskuliter

Lungengagemang vid juvenil dermatomyosit

Första dosen ska ges intravenöst, omedelbart före cyklofosfamiddosen, se annan instruktion.

Doserna vid timme 4 och 8 kan ges intravenöst eller oralt. Följ lokal rutin.

Barn: Dosen för oral mesna ska motsvara 40 % av cyklofosfamiddosen.

ÖVRIG INFORMATION

Överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering av mesna. Hudreaktioner, t.ex. urtikaria, klåda, sveda och angioödem, har observerats hos vissa patienter. Det är viktigt att vara medveten om att överkänslighetsreaktionerna kan förvärras vid återexponering och kan i vissa fall vara livshotande. På grund av risken att utveckla anafylaktiska reaktioner ska lämplig akutmedicin finnas tillgänglig.



Mesna oralt

(Uromitexan) tabletter

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

PubMed PMID Dechant K.L. et al. Ifosfamide/mesna. Review of its Antineoplastic Activity, Pharmacokinetic Properties and Therapeutic Efficacy in Cancer .Drugs 42, 428–467 (1991).

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1720382>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#5417

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa Akkawi El-Edelbi

ePedID: 5417

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-05-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT